



وزارة الداخلية  
الخدمات الطبية

## أمراض الأنسجة الداعمة



عيادات الأسنان  
إدارة الخدمات الطبية  
وزارة الداخلية


في بعض الحالات قد تنشأ حساسية الأسنان بعد التنظيف الدوري من الجير مما يجعلها حساسة عند شرب الحار والبارد لكن هذه الحساسية تكون مؤقتة وتقل تدريجياً خلال بضعة أسابيع.

عند استمرار الحساسية يجب مراجعة طبيب الأسنان لتشخيص الأسنان الحساسة وعلاجها.



مطبخ الشريعة

٦. ظهور خراج اللثة في المراحل المتأخرة من الالتهابات.



الوقاية والعلاج :

- استعمال الفرشاة والمعجون بانتظام لمنع تراكم البلاك والبكتيريا ومراجعة طبيب الأسنان بشكل دوري لتشخيص المرض والقضاء عليه قبل استفحاله والتخلص من الترسبات الجيرية التي هي عامل مساعد في تطور مرض اللثة المزمن.



ان عدم استعمال الفرشاه والمعجون لتنظيف اللثة والأسنان سيؤدي إلى تراكم فضلات الطعام والبكتيريا (البلاك).

تقوم البكتيريا الموجودة في البلاك (□□□□□□) بإفراز مواد حمضية تؤدي اللثة وتسبب انتفاخها واحمرارها وسهولة نزف الدم منها وعادة تكون غير مؤلمة في المراحل المبكرة وأعراضها غير واضحة ومع استمرار إهمال الفرشاه تتحول طبقة البلاك إلى مادة أكثر صلابة تدعى الجير الذي لا يمكن إزالته بفرشاة الأسنان ويكون وجوده عامل مساعد لتراكم المزيد من فضلات الطعام والبكتيريا ومع تراكم البلاك والبكتيريا الموجودة فيه والجير الصلب سيؤدي إلى التهابات مزمنة مع تآكل في العظم المحيط بالجذور وتلف الأنسجة الداعمة للأسنان مؤدياً إلى تخلخل الأسنان ثم فقدها.

#### أعراض التهاب اللثة :

١. الرائحة الكريهة بالفم أو المذاق السيء بسبب تجمع الفضلات بين الأسنان وعدم إزالتها وتخمرها.




٢. احمرار اللثة وتورمها وسهولة نزفها وخصوصاً عند التفريش وحياناً حين الاستيقاظ من النوم أو عند اللمس وفي المراحل الأولى يمكن السيطرة عن طريق التفريش وتوقف النزيف خلال أيام.



٣. تراجع اللثة وانكشاف الجذور مما قد يؤدي إلى حساسية أثناء الأكل والشرب.



٤. قد يرافق التهاب اللثة بعض الألم.



٥. تخلل الأسنان وظهور بعض الفراغات بينها.

